n°97.

Observation sur une Tumeur Cancéreuse et ulcerée a la joüe droite guérie par Extirpation

Par M. Pazola.

Une femme de Dieppe agée de 58 ans d'un temperament Phlégmatique apporta en naissant une Envie sur la joüe droite précisement au dessus de l'os de la pomette, cette envie avoit tout a la fois la grosseur et la figure d'une féve, Cette femme qui a eté eté bien reglée jusqu'a 49 ans, n'en avoit jamais eprouvé de douleur ce n'est que depuis deux ans qu'ayant piqué par hazard cette tumeur avec des ciseaux elle donna du Sang et devint douloureuse ce qui l'inquietta un peu ce fut alors qu'on lui assura qu'elle seroit absolument délivrée de cette tumeur si on la coupoit a sa racine; la malade se soumit a cette operation, et la playe qui en fut la suite se Cicatrisa en peu de temps.

Mais il survint bientôt apres dans le meme endroit une petite tumeur molette qui resta longtems sans augmentation sensible, ce ne fut que 10 mois apres qu'elle se trouva avoir acquis la grosseur d'une noix, cette tumeur qui avoit un pédicule n'etoit alors que tres peu douloureuse la malade ne voulut pas se soumettre a la ligature que vouloit lui en faire un Chirurgien de la ville, et elle préfera de se mettre entre les mains d'un Charlatan dont les remedes apres trois mois d'usage firent ulcerer la tumeur qui commença dés lors a faire ressentir des douleurs pongitives et lancinantes qui caracterisoient evidemment la dégénerescence en Cancer. Ce fut alors que la malade consentit a la ligature qui lui fut faite par le meme Charlatan Elle souffrit beaucoup pendant six ou sept jours au bout desquels la ligature et la tumeur tomberent.

L'Ulcere qui fut la suite de cette nouvelle Operation bien loin de se Cicatriser par l'application des remedes dont on fit usage ne cessa de s'agrandir et s'etendit bientôt depuis la region de l'os de la pomette jusqu'au dessous de la machoire inferieure. Elle occupoit toute la joüe, ses bornes anterieurement etoient a un demi pouce de la Commissure des levres et elle se terminoit posterieurement a 2 lignes de l'oreille, Cette Tumeur outre cette étendue que lui donnoit environ dix huit pouces de Circonference etoit adherente aux muscles masseter Zigomatique triangulaire et au bord anterieur du muscle Sternomastoidien

ARC 44 n°38

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

elle avoit a peu pres 3 pouces d'élevation et l'on observoit a son sommet l'ulcere dont j'ai parlé il avoit 2 pouces d'etendüe et ses bords etoient durs et renversés, il en découloit une matière sanieuse puante et les douleurs Lancinantes que la malade ressentoit dans la tumeur achevoit de caracteriser le vrai Cancer

Tel etoit l'Etat de la maladie Lorsque la femme qui en etoit affligée se présenta a l'hotel-dieu de Rouen M. Le Cat qui presuma l'operation possible y disposa la malade par les remedes generaux jusqu'au 2 May 1768 quil en fit l'operation en la maniere suivante

L'incision préliminaire des tegumens faite anterieurement et Superieurement il tira a lui la tumeur, la souleva et la tira de haut en bas et de devant en arriere en emportant toutes les parties affectées. les fibres externes du masseter celles du Zigomatique du triangulaire et une portion du bord anterieur du Sternocleidomastoi-dien furent comprises dans l'incision de meme qu'une portion de la glande parotide et son conduit Excreteur qui faisoit partie de la Tumeur l'artere maxillaire fut ouverte et emportée dans un petit trajet. l'hemoragie quelle produisit fut arretée par une compression vers l'angle de la machoire. M. Le Cat appliqua l'appareil et le soutint par un Bandage convenable

La malade fut Saignée aprés l'opération; a la levée du premier appareil qui se fit le troisieme jour, la suppuration commençoit a s'établir, et la fievre qui avoit été fort vive le premier et deuxieme jour etoit désja diminuée. On pansa la playe avec du digestif simple le troisieme jour il survint un Eresipelle autour de la playe qui gagna l'oeil et qui s'etendoit sur le front et sur les parties laterales de la tete, deux saignées et l'usage d'un liniment anodin et résolutif la firent disparoître, la suppuration étoit abondante et bonne au commencement de Juin on lui appliq.a un Cautere au bras, et elle est partie le 1.er Juillet entierement guérie a l'Exception d'une tres petite fistule Salivaire qui mouille a peine une petite Compresse pendant quelques heures lors meme que la malade parle et mange

Reflexion

Il est a présumer que si la femme qui fait le sujet de l'observation ci-devant n'eut pas irrité l'envie qu'elle portoit depuis sa naissance et qu'elle n'eut point consenti a la Sution de cette tumeur, il est a presumer dis-je qu'elle auroit vécu sans jamais y ressentir aucune douleur, Mais comment expliquer le retour de la Tumeur et sa dégénerescence en Cancer, voici sur ce point obscur quelques refflections qui pourroient bien n'être pas déplacées. il doit se faire necessairement un changement de Circulation a la baze d'une tumeur qu'on emporte. un Engorgement en est toujours la suite, et c'est cet engorgement qui donne lieu a la Supuration que fournit l'ulcere, mais la matiere purulente est le produit de l'action organique des vaisseaux. Elle n'est pas a la base d'une Envie selon le veu de la nature puisqu'elle a donné lieu a un produit informe, cette action Organique originairement viciée jointe a la douleur qui est l'effet d'une ligature d'une irritation quelconque dans l'endroit localement affecté ?peut faire dégenerer la Lymphe En humeur acrimonieuse. En humeur Cancereuse Enfin. Mais il est dans le renouvellement de ces tumeurs un mechanisme qu'il seroit bien important de pouvoir developper.

Supposons une tumeur a pédicule ancienne, et un peu considérable, si on la détache du tout par la ligature ou par une Sution au niveau des tegumens il survient fort peu de Suppuration a la baze de cette tumeur et une cicatrice paroit délivrer pour toujours de cette maladie celui qui la portoit cependant il n'arrive que trop souvent que cette guerison momentanée est suivie d'une maladie plus facheuse que la premiere le pedicule d'une pareille tumeur ou pour mieux dire son placenta rampant un peu au loin dans le tissu cellulaire ou il s'implante dans ce cas les Sucs qui devoient se rendre a la tumeur enlevée étant forcés de retrograder se pretent difficilement a prendre une route qu'ils n'avoient jamais suivie ils dilatent peu a peu les vaisseaux qui les reçoivent, de la,

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Engorgement et tumeur; les vaisseaux engorgés perdent
peu a peu de leur action organique et dans ceux du genre
des Lymphitique, l'humeur quils contiennent abandonnée a
elle même ne rentrant qu'imparfaitement dans la voye de
la circulation dégenere et devient d'une acrimonie rougeatre
qui lui fait donner alors le nom d'acrimonie cancereuse.
Il y a grande apparence quil se fait par la peripherie de
ces tumeurs qui excédent la surface de la peau une transpiration
ou peut être une Excrétion inscensible, cette Excretion arretée
et suprimée tout a coup peut encore preter secours a la cause
formatrice d'une nouvelle tumeur, mais toujours faut il
qu'une portion du pédicule ou de la base de la tumeur
ait echapé soit a l'instrument tranchant, soit a l'action
de la Ligature soit enfin a la suppuration qui est la suite
de l'Extirpation de la tumeur par l'un et par l'autre moïen
car il n'y a pas de raison pour qu'une tumeur reparut
apres avoir été Extirpée en entier sur tout lorsqu'elle n'etoit
pas encore Cancereuse.

D'après les observations et les Reflexions que je viens
d'exposer, il paroit que parmi les moyens a employer pour
la guérison de toute tumeur a pédicule celui la merite la
préference qui peut sans beaucoup de douleur et d'irritation
Emporter avec la tumeur apparente son pédicule ou la racine
et Exciter au moins après lui une suppuration assez
abondante pour détruire la portion de ce pedicule qui
pourroit avoir echapé a son action.

La Ligature ne sçauroit remplir ce double point de
vue elle n'a de prise que sur la tumeur apparente qui
a son siége au dessus des téguments, elle cause d'ailleurs
du coté du pedicule une irritation tres vive, laquelle
durant autant que l'effet de la ligature qui est tres lent
a desja souvent produit dans le pedicule un germe de tumeur
lorsque la principale vient a tomber avec la ligature. ce
moyen doit donc être absolument proscrit du traitement

de ces Sortes de tumeurs et cela avec d'autant plus de raison que l'action de la Ligature n'est jamais Suivie d'une Suppuration asser forte du coté du pédicule, ou du placenta de la tumeur pour le détruire entierement et ne laisser aucune crainte de recidive.

La Simple Extirpation de la tumeur au niveau de la peau par l'instrument tranchant me paroit encore un moyen inéficace et auquel il ne faut pas avoir recours dans de pareilles circonstances On enleve bien par la toute la tumeur exterieure sans produire une irritation considérable a la racine, Mais la Simple incision ne Sçauroit remplir une condition Essentielle celle de détruire ou par elle meme ou par une Suppuration consécutive a la quelle elle donneroit lieu, le pedicule de la tumeur emportée le quel s'implante soit dans le tissu de la peau soit dans le Corps graisseux; car l'on scait de reste qu'une telle Opération n'entraine pas apres elle une Suppuration tres abondante

Le Caustique a le double désavantage d'être inéficace et trés dangereux au moins lorsqu'on l'emploie avec trop de menagement l'irritation qu'il produit dans la tumeur se Communique bientôt a Son pedicule et dans le voisinage, la douleur qu'il cause donne lieu a un Eretisme Si violent du coté de la partie affectée que l'action organique des vaisseaux changée brusquement fait dégenerer fort vite les liqueurs qui entroient dans la Composition de la tumeur; la quelle bien loin de diminuer de volume prend asser souvent un accroissement trés considérable et cela parceque par le moyen de l'irritation, la tumeur augmente plus du coté de Sa base que le Caustique par son action immédiate n'en détruit a Sa Superficie d'ou il arrive que l'usage de ce moyen est le plus Souvent suivi d'une augmentation de la tumeur, et de Sa dégenerescence et Cancer, double motif pour exclure absolument le Caustic du traitement des tumeurs a pedicules et de celles qui sont toute Carcinomateuse Son application pourroit Cependant être quelques fois suivie de Succés, ce Seroit lorsqu'on l'appliqueroit en assez grande quantité de façon que toute la superficie de la tumeur et la base fussent attaqués a la fois la déstruction presque totale de la tumeur et de son pedicule

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Engorgement et tumeur; les vaisseaux engorgés perdent peu a peu de leur action organique et dans ceux du genre des Lymphitique, l'humeur quils contiennent abandonnée a elle même ne rentrant qu'imparfaitement dans la voye de la circulation dégenere et devient d'une acrimonie rougeatre qui lui fait donner alors le nom d'acrimonie cancereuse. Il y a grande apparence quil se fait par la peripherie de ces tumeurs qui excédent la surface de la peau une transpiration ou peut être une Excrétion insensible, cette Excretion, arretée et suprimée tout a coup, peut encore preter secours a la cause formatrice d'une nouvelle tumeur, mais toujours faut il qu'une portion du pédicule ou de la base de la tumeur ait echapé soit a l'instrument tranchant, soit a l'action de la Ligature soit enfin a la supuration qui est la suite de l'Extirpation de la tumeur par l'un et par l'autre moïen car il n'y a pas de raison pour qu'une tumeur reparut apres avoir été Extirpée en entier sur tout lorsqu'elle n'étoit pas encore Cancereuse.

D'après les observations et les Reflexions que je viens d'exposer, il paroit que parmi les moyens a employer pour la guérison de toute tumeur a pédicule celui la merite la préference qui peut sans beaucoup de douleur et d'irritation Emporter avec la tumeur apparente son pédicule ou la racine et Exciter au moins après lui une suppuration assez abondante pour détruire la portion de ce pedicule qui pourroit avoir echapé a son action.

La Ligature ne sçauroit remplir ce double point de vüe elle n'a de prise que sur la tumeur apparente qui a son siége au dessus des téguments, elle cause d'ailleurs du côté du pedicule une irritation trez vive, laquelle durant autant que l'effet de la ligature qui est tres lent a desja souvent produit dans le pedicule un germe de tumeur lorsque la principale vient a tomber avec la ligature, ce moyen doit donc être absolument proscrit du traitement

presenter avec la saine Théorie, je joindrai ici une seconde observation assez semblable a la premiere et qui nous offre les memes resultats dans les procedés qu'on a suivis, ce qui servira parfaitement bien a Etayer l'idée que je me suis faite de la maniere dont on doit attaquer les tumeurs a pédicule.

Un Prêtre Recteur du Seminaire de Verone agé de 45 ans, d'un temperament Sanguin apporta en naissant une envie située sur la ligne blanche et environ 4 doigts au dessous de l'ombilic, elle formoit une tumeur flasque et pendante de la grosseur et de la figure d'une Cerise, ayant irrité en dormant cette tumeur avec l'ongle, il y survint douleur qui lui fit appeller son chirurgien, celui ci lia cette petite tumeur qui tomba sous peu de jours, le prêtre parut alors gueri mais quelques mois aprés il survint dans le meme endroit une nouvelle tumeur qui eut bientot acquis plus de volume que la première, il s'adressa au chirurgien qui lui conseilla pour lors l'Extirpation avec l'instrument tranchant, il y consentit et dans le moins de 15 jours le malade parut guery de façon a le croire quitte de cette maladie cependant il ne tarda pas a voir reparoitre une tumeur dans le meme lieu, elle parvint en moins de six mois a la grosseur d'un tres gros champignon Elle avoit un pedicule assez considérable; Le malade avoit passé tout ce temps la dans de vives inquiétudes qui etoient d'autant mieux fondées qu'il ressentoit dans la tumeur des douleurs vives aigues et l'ancinantes. effrayé de son etat il consulta plusieurs personnes de l'Art qui furent de differents avis, les premieres operations qu'il avoit essuyé inutilement lui avoient fait perdre toute la confiance qu'il avoit dans la Chirurgie, Elle ne paroissoit plus a ses yeux cette Science si certaine qui trouve des ressources contre les maux les plus graves, c'etoit cependant du Sein de la Chirurgie que devoit sortir le

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

seroit alors le produit d'une seule application et la suppuration abondante qui en seroit la suite et qu'on favoriseroit par les suppurants doux pourroit achever la destruction de tout ce qui auroit épargné le caustic mais la douleur vehemente qui seroit la suite d'une pareille application et l'incertitude meme du succès ne permettent pas de s'arêter a un pareil moyen.

Ce n'est que par l'instrument tranchant qu'on peut remplir surement la double indication que presente la curation de cette espece de maladie sçavoir d'emporter la totalité de la tumeur avec son pédicule et de donner lieu a une suppuration assez abondante du coté de la racine de cette tumeur sans y produire une irritation trop forte, mais l'on conviendra de reste que pour que ce moyen soit efficace il faut avoir soin d'enlever la tumeur qui est audessus de la surface de la peau d'emporter son pedicule avec les tegumens qui l'entourent et de penetrer assez avant dans le tissu celullaire ou dans les chairs d'ou pourroient prendre naissance le placenta de la tumeur, la guerison est d'autant plus sure par cette methode que la maladie est emportée en entier, et que la supuration qui est necessairement la suite d'une destruction assés considerable de parties a la base de la tumeur, détruit tout ce qui auroit pû lui appartenir comme racine et exclut par ce moyen toute crainte de récidive.

L'observation que je viens de rapporter est une preuve de la bonté du traitement que j'indique et démontre l'inéficacité soit de la ligature soit de la simple section du pedicule de la tumeur au niveau des tégumens, soit enfin du caustic dont l'application est en outre très dangereuse, cette observation est d'autant plus probatoire qu'elle rassemble en elle l'application des 4 moyens curatifs dont j'ay exposé en précis les avantages et les inconveniens

Mais comme un simple fait ne sçauroit devenir une regle de conduite quelque accord qu'il semble

Remede qui devoit lui conserver la vie et lui rendre la Santé. Ce fut a cette Epoque qu'il alla a Bologue il se fit visiter par les Celebres Molinelli et Galli qui Conclurent tous les deux pour l'Extirpation comme seul et unique remede, de retour a Verone il se mit entre les mains de M. Montagne Medecin et Chirurgien qui l'opera en détruisant la Tumeur par la Baze, cette operation ne fut suivie d'aucun accident remarquable au bout d'un mois la playe étoit prête a se Cicatriser lorsque M. Montagne s'apperçut qu'a la partie inferieure de la playe il s'élevoit une petite grosseur il l'emporta sans rien dire au malade il eut la précaution d'anticiper bien au dela de la Tumeur 25 jours apres cette derniere Opération le malade fut parfaitement bien gueri, et il jouit encore actuellement d'une bonne Santé.

Ces deux Observations nous forcent de convenir que les tumeurs a pedicules ne sont jamais plus surement détruites que par l'instrument tranchant et que l'on a gueres de Recidives a craindre de son usage; si l'on prend les Précautions que j'ay indiquées ci-devant, la premiere observation nous prouve encore que le dogme trop Generalement repandu, de ne point attaquer les Cancers du visage ou <u>Noli me tangere</u> est un dogme pernicieux qui a fait beaucoup de victimes pour avoir inspirer trop de timidité a la plus part des praticiens il n'y a que les Chirurgiens bien instruits et consommés dans l'Exercice de l'Art qui puissent se mettre au dessus des Regles et se frayer eux memes une route que personne ne leur a tracée. Mais combien est il de cette Espece rare d'hommes qui osent franchir les Barrieres de l'habitude et du préjugé. Hildanus apres avoir donné les Observations

de deux Cancers qu'il avoit gueri par Extirpation d'ou l'un étoit Situé a la racine des dents canines, et l'autre dans la partie inferieure de la joue. cherche a rassurer les jeunes Chirurgiens sur l'evenement dans ces sortes de maladies par des Expressions que mon Sujet ne me permet pas de me rendre propre et que je vais repeter avec lui. me hasce duas observationes Scripsisse ut animum juvenibus chirurgis adderet nein cancrosis tumoribus in ore existintibus facile desesperent & ab officio desinent dommodo ipsos apprehendere & radicitûs extirpare possint

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE